



CONTIENE

- 1L** **Bacthon[®] SC**
- 300 gr** **TrichoD[®] WP**
- 100 gr** **Micos Plag[®] WP**

¿DÓNDE SE USA?

En cultivos agrícolas tradicionales o tecnificados, de corto ciclo o perennes, sembrados en suelos productivos con varias cosechas, donde las raíces del cultivo se intoxican, donde las plantas se están enfermando y muriendo, donde las raíces son atacadas por nematodos y por insectos plaga, donde los cultivos son atacados por insectos plaga, donde las producciones están bajando.

¿PARA QUÉ SE USA?

Para Desintoxicar el suelo y las raíces del nuevo cultivo, para Bloquear las enfermedades en el suelo y en el cultivo, para Proteger las raíces del daño por nematodos y por insectos plaga. Para mejorar la producción y la calidad de la cosecha.

Aplicación

1 Kit X HECTÁREA

- Presiembra
- Siembra
- Post siembra

Temprano en aspersión dirigido a toda la superficie del suelo húmedo en capacidad de campo.

En la cinta de riego después de humedecer el suelo.

Se aplica otro Kit antes de los 30 días.

Se puede aplicar en mezcla con agroinsumos.

Por litro de agua de mezcla dirigido al suelo húmedo.

Para una bomba de aplicación de 20 litros de agua.

10 cc **Bacthon[®] SC**

3 gr **TrichoD[®] WP**


1 gr **Micos Plag[®] WP**

200 cc **Bacthon[®] SC**

60 gr **TrichoD[®] WP**

20 gr **Micos Plag[®] WP**

Se usan para asperjar 1.000 m² de superficie de vivero.



Aplicación

1 Kit X HECTÁREA

En aspersión sobre toda la superficie del suelo húmedo en capacidad de campo,

En el surco o en la cinta de riego después de humedecer el suelo.

Se aplica de nuevo el Kit después de cada poda y máximo cada cuatro meses.

CON EL INICIO DE LA SEMBRA Y CADA 30 DÍAS

10 cc **Bacthon[®] SC**

3 gr **TrichoD[®] WP**

1 gr **Micos Plag[®] WP**

POR CAMA DE 30 m² DILUIDO EN AGUA

En aspersión, en drench o en cinta de riego en suelo húmedo con capacidad de campo.